




Corpo Nazionale  
Vigili del Fuoco

Comando Provinciale

## PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO

### PROTOCOLLO S.T.A.R.T. (SIMPLE TRIAGE AND RAPID TREATMENT)



## PBLS (da 0 alla pubertà)

<b>A</b>	<b>Valutazione ambiente e stato di coscienza</b> <b>Se non cosciente:</b> ➤ <b>ALLERTARE</b> il 1-1-8 o (se solo) chiama aiuto senza abbandonare la vittima; se la vittima è cardiopatica allertare immediatamente 1-1-8 ➤ superficie rigida, posizione supina, allineamento arti, torace e addome scoperti ➤ ispezione ed eventuale svuotamento del cavo orale ➤ <b>posizione neutra del capo</b>													
	<b>Valutazione del respiro (G.A.S. 10")</b> <b>Respiro presente</b> Posizione Laterale di Sicurezza. <b>Respiro non presente:</b> 5 insufflazioni di soccorso													
<b>C</b>	<b>Valutazione Polso Centrale segni di circolo:</b> <b>Polso presente:</b> (FC sup. a 60 b.p.m.): continuare con le ventilazioni (20 al min.) <b>Polso non presente:</b> (o FC inf. a 60 b.p.m.): Compressioni Toraciche Esterne <b>15 C.T.E. / 2 ventilazioni (5 cicli)</b> Rivalutare il polso dopo 1 minuto (5 cicli)													
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">POLSO PRESENTE</th> <th rowspan="2">POLSO ASSENTE ALLERTARE IL 118 <small>(se non ancora fatto)</small> 15 CTE e 2 ventilazioni Fino alla comparsa dei segni di circolo</th> </tr> <tr> <td>Rivalutare il respiro (GAS 10 sec.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>PRESENTE</b></td> <td><b>ASSENTE</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Valuta coscienza</b></td> <td><b>Alertare 118</b> <small>(se non ancora fatto)</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Se non cosciente</b> <b>Alertare 118</b> <small>(se non ancora fatto)</small></td> <td><b>ventilare 20 insuf./min</b> <b>e RIVALUTARE il polso</b></td> <td></td> </tr> </table>	POLSO PRESENTE		POLSO ASSENTE ALLERTARE IL 118 <small>(se non ancora fatto)</small> 15 CTE e 2 ventilazioni Fino alla comparsa dei segni di circolo	Rivalutare il respiro (GAS 10 sec.)		<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>		<b>Valuta coscienza</b>	<b>Alertare 118</b> <small>(se non ancora fatto)</small>		<b>Se non cosciente</b> <b>Alertare 118</b> <small>(se non ancora fatto)</small>	<b>ventilare 20 insuf./min</b> <b>e RIVALUTARE il polso</b>
POLSO PRESENTE		POLSO ASSENTE ALLERTARE IL 118 <small>(se non ancora fatto)</small> 15 CTE e 2 ventilazioni Fino alla comparsa dei segni di circolo												
Rivalutare il respiro (GAS 10 sec.)														
<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>													
<b>Valuta coscienza</b>	<b>Alertare 118</b> <small>(se non ancora fatto)</small>													
<b>Se non cosciente</b> <b>Alertare 118</b> <small>(se non ancora fatto)</small>	<b>ventilare 20 insuf./min</b> <b>e RIVALUTARE il polso</b>													
<b>D</b>	Utilizzo del DAE è consentito nei bambini sopra l'anno di età (anche in mancanza di piastre pediatriche. Utilizzare quelle da adulto)													

## SVT

<b>A</b>	Verifica l'allertamento del 118 Valuta la sicurezza e la dinamica <b>Valutazione Rapida (Vitalità (Mo-To.Re.) e Emorragie)</b> Blocca la testa, valuta lo stato di coscienza e ottiene la posizione neutra (se possibile) <b>Se non cosciente:</b> pervietà vie aeree (sublussa mandibola se inefficace iperestendi NO P.L.S.), se necessario BLS-D <b>Se cosciente:</b> : assicura pervietà vie aeree, verifica deviazione della trachea, turgore giugulari, valuta ferite collo. Posiziona il collare cervicale Somministra ossigeno in maschera con reservoir (10/12 Lt/min)
	<b>B</b>
<b>C</b>	Controlla la presenza di <b>emorragie esterne</b> Controlla presenza <b>polso radiale</b> e frequenza cardiaca (da riferire) Temperatura e colore dell'acute <b>Polso radiale assente:</b> controlla FC al polso carotideo
<b>D</b>	<b>Rivaluta lo stato di coscienza</b> A (alert- sveglio)- V (verbal- risp. a stimoli verbali)- P (painful- risp. a stimoli dolorosi)- U (unresponsive - non risponde) <b>Se la vittima è Unresponsive torna alla fase A del BLS-D</b>
<b>E</b>	<b>Esegui un accurato controllo testa/piedi (visivo e tattile)</b> ✓ Testa: fratture ossa craniche e viso, otorino - liquorrea, segni di Battle, occhi del procone, lesioni maxillo facciale; ✓ Collo: deviazione della trachea, turgore delle giugulari, collo; ✓ Torace: enfisema sottocutaneo, ispezione dorso con guanti puliti; ✓ Addome: rigidità, dolore, lesioni; ✓ Bacino: dolore o scricchiolii (creste Iliache), lesioni; ✓ Gambe/brac.: sensibilità e motilità, dolore, lesioni. Copri la vittima per prevenire l'ipotermia (coperta termica)
	Comunica alla Centrale 118 i parametri rilevati - rivaluta la vittima continuamente Se richiesto: immobilizza e trasporta In caso di ustione grave nessuna variazione della manovra

## BLS-D adulto

<b>A</b>	<b>Valutazione ambiente e stato di</b> <b>Se non cosciente:</b> ➤ <b>ALLERTARE 1-1-8</b> ➤ Richiedere un DAE ➤ Allineare, "piano rigido", scoprire <b>PERVIETA' VIE AEREE</b> , iperestendere				
	<b>Valutazione RESPIRO e CIRCOLO</b>				
<b>B</b>	<b>Valutazione respiro (G.A.S. 10")</b> <b>Respiro presente</b> Posizione Laterale di Sicurezza (P.L.S.) <b>Respiro non presente</b> RCP fino all'arrivo di un DAE				
<b>C</b>	<b>Valutazione polso e segni di circolo: 10"</b> <b>Polso presente :</b> continuare con le ventilazioni (10 al min.) <b>Polso non presente</b> Confermare all' 1-1-8 A.C.C. e uso del DAE Compressioni Toraciche Esterne (30:2) fino all'arrivo DAE (Continuare a massaggiare fino attivazione analisi)  Rivalutare B/C alla comparsa dei segni di circolo (MO.TO.RE.) ✓ se respiro presente: PLS ✓ se respiro assente: 10 vent. al minuto e si rivaluta B/C ogni minuto (con polso presente)				
	<b>USO DEL DAE</b> ✓ Accendere <b>IMMEDIATAMENTE</b> il DAE, ✓ collegare le piastre e avviare l' <b>ANALISI</b> ✓ <b>IMPORTANTE: SICUREZZA DELL'AREA</b>				
<table border="1"> <tr> <th>SHOCK INDICATO</th> <th>SHOCK NON INDICATO</th> </tr> <tr> <td>Defibrillare (1 scarica) RCP per 2 min. fino all'<b>ANALISI</b> o alla ricomparsa dei segni di circolo (MO.TO.RE.)</td> <td>RCP per 2 min. fino all'<b>ANALISI</b> o alla ricomparsa dei segni di circolo (MO.TO.RE.)</td> </tr> </table>		SHOCK INDICATO	SHOCK NON INDICATO	Defibrillare (1 scarica) RCP per 2 min. fino all' <b>ANALISI</b> o alla ricomparsa dei segni di circolo (MO.TO.RE.)	RCP per 2 min. fino all' <b>ANALISI</b> o alla ricomparsa dei segni di circolo (MO.TO.RE.)
SHOCK INDICATO	SHOCK NON INDICATO				
Defibrillare (1 scarica) RCP per 2 min. fino all' <b>ANALISI</b> o alla ricomparsa dei segni di circolo (MO.TO.RE.)	RCP per 2 min. fino all' <b>ANALISI</b> o alla ricomparsa dei segni di circolo (MO.TO.RE.)				